

¡Disfruta observando las Aves de Alto Palena!

Nuestro País cuenta con más de 500 especies de aves, de las cuales alrededor de 240 se pueden avistar en la Región de Los Lagos, y al menos 84 se han registrado en la comuna de Palena, hasta ahora. Sumérgete en nuestra cordillera, bosques, lagos, ríos y contempla el Tesoro mejor guardado de la Patagonia.

¡Te invitamos a conocerlas en Alto Palena!



DATO CURIOSO:

¿SABÍAS QUE EL ESTUDIO DE LAS AVES SE LLAMA ORNITOLOGÍA?

DIMORFISMO SEXUAL:

Diferencias físicas marcadas entre el macho y la hembra (plumaje, colores, etc)

COMO AYUDAR EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE NUESTRAS AVES:

Mantén a los gatos y perros alejados de las zonas naturales. Si sales a observar; tomate tu tiempo y guarda silencio. Respeta a las aves en su hábitat.

¡Cartilla PDF!



Colaboradores: Cesar Muñoz, Vicente Valdés, Javiera Undurraga, Natalia Ibañez, Aoni Patagonia, Catalina Tapia, Ana Belén Vargas

A



TURISMO EDUCATIVO

LosLagos.Travel/turismo-educativo

¡CATÁLOGO VIRTUAL!

EXPERIMENTA LOS **SONIDOS** DE LOS DIVERSOS CANTOS DE LAS AVES DE PALENA



Palena.LosLagos.Travel



Cartilla Avistamiento de Aves Alto Palena



Folletería Educativa Turismo Alto Palena



Carpinterito, cuyo nombre científico es *Dryobates lignarius*, es un carpintero pequeño (18 cm) que vive en los bosques esclerófilos y templados del país, desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de pequeños insectos y larvas en la corteza de árboles medianos.



Carpintero negro, su nombre científico es *Campephilus magellanicus*, es el más grande de los carpinteros de Chile (45 cm). Se le puede observar en zonas de bosques maduros y altos, desde la Región de Magallanes hasta la Región del Maule. Perfora los troncos para alimentarse de larvas e insectos. [dimorfismo sexual]



Comesebo Grande, cuyo nombre científico es *Pygarrhichas albobularis*, es un habitante habitual de los bosques desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes. Mide 16 cm y se alimenta de insectos, removiendo pedazos de corteza y trepando por los troncos.



Lechuza, cuyo nombre científico es *Tyto alba*, mide 38 cm y se le puede encontrar en campos abiertos, ciudades y parques desde la Región de Arica hasta la Región de Magallanes. Es una especie nocturna y se alimenta de pequeños roedores, como el ratón de cola larga.



Chuncho común, de nombre científico *Glaucidium nana*, es un búho pequeño (20 cm), se le puede encontrar en bosques abiertos, en áreas de parques y zonas de arbustos altos, desde la Región de Atacama hasta la Región de Magallanes. De hábitos mayoritariamente nocturnos, se alimenta de pequeñas aves y mamíferos.



Concón, de nombre científico *Strix rufipes*, es un búho de 38 cm, que vive en bosques maduros, densos, húmedos y altos desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes. De hábitos nocturnos, se alimenta de ratones y otros mamíferos pequeños, aunque en ocasiones también de aves, anfibios e insectos.



Tucuquere, cuyo nombre científico es *Bubo Virginianus magellanicus* mide 45 cm, vive en bosques abiertos, áreas de parque e incluso quebradas cordilleranas y laderas de cerros, desde la Región de Arica hasta la Región de Magallanes. De hábitos nocturnos, se alimenta de aves y mamíferos.



Águila mora, de nombre científico *Geranoaetus melanoleucus*, es un ave rapaz que se puede encontrar en laderas de cerros, quebradas y acantilados de montaña, además de orillas de lagos, lagunas y tranques, desde la Región de Arica hasta la Región de Magallanes. Los machos miden 65 cm y las hembras 80 cm. Se alimentan de mamíferos y aves de tamaño medio, además de carroña.



Traro o Carancho Común, de nombre científico *Caracara plancus*, se le puede encontrar en terrenos abiertos, bordes de bosque y zonas forestadas, desde las costas de la Región de Arica hasta la región de Magallanes. Es un ave grande, de 58 cm, que se alimenta de aves y mamíferos que preda, además de cadáveres y todo tipo de carroña.



Peuquito, cuyo nombre científico es *Accipiter bicolor*, es un ave rapaz pequeño (hembra de 42 cm, macho de 38 cm) que se le puede encontrar en zonas boscosas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de aves que acechan desde los árboles.



Pato Jergón Chico, de nombre científico *Anas flavirostris*, es un pato de 40 cm que vive en todo tipo de ambientes acuáticos, desde el altiplano y la cordillera hasta la zonas costeras, desde la Región de Arica hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de invertebrados acuáticos como insectos, crustáceos, anfipodos y también de plantas acuáticas y sus semillas.



Pato Cortacorrientes, de nombre científico *Merganetta armata*, es un pato de 40 cm que vive en ríos y riachuelos andinos torrentosos de la Región de Arica, y entre la Región de Atacama hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de insectos, larvas, moluscos y algas. [dimorfismo sexual]



Bandurria, de nombre científico *Theristicus melanopis*, es un ave de 74 cm que se encuentra en terrenos costeros, húmedos, zonas pre-cordilleranas y al borde de bosques cercanos a grandes lagos, además de ciudades y poblados, en la Región de Arica, y entre la Regiones de Atacama y la Región de Magallanes. Se alimenta de sapos, renacuajos, lombrices e insectos.



Martín pescador, su nombre científico es *Megaceryle torquata*, mide 44 cm y vive a orillas arboladas y barrancas de lagunas, lagos y ríos, entre la cordillera de la Región del Bío-Bío, hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de peces, que obtiene al zambullirse en el agua.



Chuco, de nombre científico *Scelorchilus rubecula*, es un tapaculo de 19 cm, se le encuentra en bosques templados húmedos desde la región de O'Higgins hasta la Región de Aysén. Se alimenta de insectos que obtiene al escarbar el suelo con sus patas.



Hued-hued del Sur, cuyo nombre científico es *Pteroptochos tarnii*, es un tapaculo de 24 cm que vive en bosques templados húmedos desde la Región de Bío-Bío hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de pequeños insectos, frutos y semillas que obtiene al escarbar en el suelo.



Yal cordillerano, de nombre científico *Melanodera xanthogramma*, es un ave poco común que mide 15 cm y que es posible de encontrar en zonas de matorrales pre-cordilleranos, en lechos de ríos y estacionalmente en costas marinas de fiordos, desde La Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de frutos, granos y semillas.



Fío-fío, de nombre científico *Elaenia albiceps*, es un cazamoscas de 15 cm que tiene un característico silbido que le da su nombre. Está presente en todas las regiones del país y habita en bosques, parques, jardines, ciudades y pueblos. Se alimenta de semillas, frutos e insectos



Picaflor chico o Picaflor chileno, de nombre científico *Sephanoides sephaniodes*, es un picaflor de 11 cm que vive en bosques, ciudades, parques y jardines desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes. Se alimentan del néctar de las flores. [dimorfismo sexual]



Diucón, cuyo nombre científico es *Xolmis pyrope*, es un cazamoscas grande y de característicos ojos rojos. Mide 21 cm y vive en bosques abiertos, parques, ciudades y pueblos, desde la Región de Antofagasta hasta la Región de Magallanes. Se alimenta de "cuncunas" y otros insectos grandes.